

安全注射執行情形查檢表

縣市別：_____ 醫療機構名稱：_____

安全注射行為	執行情形		備註
	是	否	
準備和施打注射藥品前應執行手部衛生			
以無菌操作技術在清潔乾淨區域準備注射藥品 (清潔乾淨區域指不會接觸到血液、體液、汙染的儀器設備或受到其汙染的區域)			
注射針、針筒、注射藥品使用的管路(tubing)和轉接器(connector)等，只能使用於單一病人 (包括預先填充藥品的針筒(prefilled syringes)和匣式設備(cartridge devices)，如胰島素注射器)			
以注射針穿刺藥瓶的橡膠軟塞前，應先使用酒精擦拭消毒軟塞			
應使用新的注射針和針筒進入藥瓶抽取藥品，不可將針頭留置於藥瓶上重複抽取藥品，即使是同一位病人需要增加取用的劑量			
注射藥品應於接近施打時間時抽取或調製，並於抽取或調製後儘速施打			
單一劑量包裝*或單次使用的小瓶裝、安瓿裝、瓶裝、袋裝靜脈注射藥品僅限單一病人使用			
多劑量包裝*的藥品在開封後應標註日期(開封日與到期日)及存放於適當環境，並應依廠商說明書使用，超過開封後可使用期限應立即丟棄；若廠商說明書未載明開封後可使用期限，則最長不可超過 28 天			
多劑量包裝藥品建議盡可能提供給單一病人使用，如需提供超過一位病人使用，應集中存放在清潔乾淨區，切勿帶到病人治療區，避免交叉汙染			
應有能安全處理針類廢棄物的容器；且工作人員應明確知悉使用後的尖銳物品處理步驟			

*藥品包裝屬單一劑量或多劑量包裝之認定應以廠商說明書為準，勿以藥品包裝體積做為單一劑量或多劑量包裝的判斷依據；單一劑量包裝通常不含防腐劑(preservative)，因此使用後殘餘藥品應立即丟棄。另多劑量包裝藥品開封後若對其無菌狀態有所疑慮，即使尚在開封後可使用期限內，仍應立即丟棄。

查核人員簽章：_____

稽查日期：_____年_____月_____日